

Elastik-behandling af hæmorider

Hæmorider er åreknuder i endetarmsåbningen.

I lette tilfælde sidder de indenfor, og kun slimhinden falder frem. Hæmorider kan også sidde udenfor endetarmsåbningen (ydre hæmorider). Disse kan skrumpe, således at hæmoriden forsvinder, og kun den overskydende hud bliver tilbage. Dette kaldes marisker.

Elastik-behandling:

De indre hæmorider kan elastikbehandles. Herved afsnøres hæmoriden, og den vil da visne og falde af. Indgrebet er smertefrit.

Efter elastikbehandlingen:

Det er normalt i 1 til 2 døgn at have lettere trykkende smerter/fornemmelse i endetarmen, afføringstrang og en smule blødning fra tarmen. Smerterne kan afhjælpes med Paracetamol og Ibuprofen. Der er ingen problemer med at komme af med afføringen. Især hos mænd kan der i de første dage forekomme hyppig vandladningstrang og trykken over blæren. Du må tørre dig som vanligt efter toiletbesøg. Der kan føles stramning og afføringstrang det første halve til hele døgn.

Efter 3-10 dage falder den lille sorte elastik af i forbindelse med afføring. Også på dette tidspunkt kan der være en smule blødning og svie. Dette er harmløst og forsvinder.

I meget sjældne tilfælde kan der opstå kraftig blødning eller stærke smerter i endetarmen. Skulle dette ske, skal du kontakte en Akutklinik (skadestue).

Ambulant kontrol:

Du vil få en tid til kontrol 3-4 uger efter elastikbehandlingen. Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen.

Jeg har modtaget både skriftlig og mundtlig vejledning omkring undersøgelsen. Jeg har forstået vejledningen og accepterer undersøgelsen.

Dato: _____

Navn: _____

Cpr. nummer: _____