

Gastroskopi

(Kikkertundersøgelse af spiserør og mavesækken)

Gastroskopi er en kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm med en bøjelig kikkert ført igennem munden. Der kan tages vævsprøver igennem kikkerten.

Hvis du får følgende mavesårsmedicin: Nexium, Losec, Lanzo, Pantoloc eller Pariet – skal du om muligt undlade at tage medicinen 1 uge før undersøgelsen, da det ellers kan være vanskeligt at påvise mavesårsbakterier. Du kan i stedet indtil 1 døgn før undersøgelsen tage håndkøbsmedicin mod syre, f.eks. Alminox, Balacid, Link eller Novaluzid.

Forberedelse:

Du skal være fastende i mindst 6 timer før undersøgelsen. Dog må man gerne drikke et lille glas vand 2 timer før, hvis man er meget tørstig. Nødvendig medicin kan tages om morgenen.

Undersøgelsen:

Efter at være blevet lokalbedøvet med spray (valgfrit) i svælget føres skopet ned gennem spiserør, mavesæk og tolvfingertarm.

Du kan på anmodning herom få en injektion med et beroligende middel. Du må i givet fald sørge for hjemtransport ved pårørende, Falck eller taxa.

Undersøgelsen foregår liggende på venstre side. Kikkerten føres igennem munden til spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Der er rigelig plads til at trække vejret.

Undersøgelsen er ikke forbundet med smerter, kun let ubehag fornemmes, når slangen synkes.

Ligeledes kan luft spænding i maven forekomme. Undersøgelse varer 3-5 minutter.

Resultat:

Resultatet af undersøgelsen gives umiddelbart efter afslutning af undersøgelsen.

Hvis der er givet beroligende medicin, må du ikke føre bil eller tage på arbejde samme dag.

Hvis der er brugt svælg bedøvelse må du ikke spise eller drikke den 1. time efter undersøgelsen. Ellers kan man spise og drikke umiddelbart efter undersøgelsen.

Jeg har modtaget både skriftlig og mundtlig vejledning omkring undersøgelsen. Jeg har forstået vejledningen og accepterer undersøgelsen.

Dato: _____

Navn: _____

Cpr. nummer: _____