

Operation i lokalbedøvelse

Før operationen:

Hvis du har pacemaker eller er i behandling med blodfortyndende medicin (fx Magnyl eller Marevan), skal dette oplyses en uge før operationen. Undlad at smøre crème på huden.

Operationen:

Huden desinficeres med klorhexidinsprit, jod eller lignende. Lokalbedøvelsen sprøjtes ind under huden med en tynd nål, det svier og spænder ca. 1 minut. Man kan ved operationen ofte mærke berøring men ikke smerte. Såret lukkes med en tråd, der oftest skal fjernes efter 7-14 dage på klinikken eller hos praktiserende læge.

Efter operationen:

Mod smerter: Lokalbedøvelsen holder i 2-6 timer. Med mindre andet er aftalt, kan der mod smerte tages almindelige håndkøbs præparater Paracetamol, Kodimagnyl eller evt. Ibuprofen.

Forbinding:

Forbindingen fjernes efter 3 dage (med mindre andet er aftalt). Ved behov kan såret derefter dækkes med Micropore (købes på apoteket).

Restriktioner:

Med mindre andet er aftalt, er der ingen restriktioner i hvad man må, dog frarådes badning i svømmehal og havvand, indtil trådene er fjernet og såret er helet.

Komplikationer:

I sjældne tilfælde kommer der blodansamling, som oftest forsvinder af sig selv efter nogle dage til uger. I yderst sjældne tilfælde

kommer der betændelse. I meget sjældne tilfælde bliver ar grimme eller fortykkede. I yderst sjældne tilfælde udvikles en overfølsomhedsreaktion mod lokalbedøvelse, dette kræver hurtig behandling eller eventuel indlæggelse på hospital.

Ved større blødning, blodansamling eller tegn på betændelse (rødme, varme, hævelse, temperatur over 38.5) kontaktes Akutklinik (skadestue).

Jeg har modtaget både skriftlig og mundtlig vejledning omkring undersøgelsen. Jeg har forstået vejledningen og accepterer undersøgelsen.

Dato: _____

Navn: _____

Cpr. nummer: _____