

Operation i og omkring endetarmsåbningen

Operation i eller omkring endetarmsåbningen foretages, fx hvis man skal fjerne større hæmorider, løs hud efter hæmorider (marisker) eller bylder.

Operationen:

Operationen udføres i lokalbedøvelse, som anlægges via et stik i selve hæmoriderne eller i vævet omkring endetarmsåbningen.

Efter operationen:

Mod smerter: De første 2-3 dage efter operationen kan være smertefulde, hvorfor man med fordel vil kunne blødgøre afføringen for at lette passagen igennem operationssåret (svesker, Laktulose mixtur, Magnesia). Mod smerter kan tages Paracetamol, Kodimagnyl eller Ibuprofen, med mindre andet er aftalt.

Forbinding:

Eventuel forbinding fjernes dagen efter operationen. Operationssårene rengøres bedst ved at skylle med en håndbruser to gange dagligt efter toiletbesøg. Duppes tørt med blød klud. Der skal ikke anvendes sæbe eller cremer i området. Ved toiletbesøg uden for hjemmet kan "baby" vådservietter forsigtigt anvendes til aftørring.

Eventuelt kan kolde omslag anvendes (kuldepakning, kolde ærter eller isterninger i stofbetræk), både for at standse blødning og reducere smerter. Der skal ikke fjernes sting.

Sygemelding:

Efter nogle operationer kan sygemelding være nødvendig i 3-5 dage. Der aftales evt. kontrol 3 uger efter operationen.

Komplikationer:

Blødning er meget sjældent, og infektion er yderst sjældent.

Ved større blødning eller tegn på betændelse skal Akutklinik (skadestuen) kontaktes.

Jeg har modtaget både skriftlig og mundtlig vejledning omkring undersøgelsen. Jeg har forstået vejledningen og accepterer undersøgelsen.

Dato: _____

Navn: _____

Cpr. nummer: _____