

Sigmoideoskopi

(Kikkertundersøgelse af endetarmen og den nederste del af tyktarmen)

Før undersøgelsen:

Tager du blodfortyndende medicin (f.eks. Hjertemagnyl, Marevan eller

Plavix/ Clopidogrel), eller har du pacemaker, skal det oplyses klinikken mindst 1 uge før undersøgelsen.

Aftenen før undersøgelsen må der kun indtages flydende kost, som omfatter: Vand, klare supper, siede supper, juice, kaffe, the, saft og sodavand. Yogurt og andre mælkeprodukter er også tilladt - dog kun i begrænset mængde.

Undersøgelsesdagen:

På apoteket hentes et Klyx 240 ml (lavement). 1-2 timer før undersøgelsen

tages lavementet. Man lægger sig på venstre side - sprøjter væsken fra flasken ind i tarmen, holder på det 5-15 minutter og går på toilettet og tømmer tarmen.

Man skal ikke være fastende !!! Du må spise og drikke normalt, både før og efter at du har taget Klyx.

Undersøgelsen

Ved undersøgelsen ligger du på venstre side. Der kan ved undersøgelsen være ubehag fra luften, der pustes ind i tarmen samt lette smerter på grund af træk i tarmen. Selve undersøgelsen varer ca. 5 - 10 min. Der kan uden smerter tages vævsprøver og fjernes evt. polyper.

Efter undersøgelsen:

Resultatet på undersøgelsen får du med det samme.
Du kan tage på arbejde efter denne type undersøgelse.

Resultat:

I nogle tilfælde vil der blive taget vævsprøver til nærmere mikroskopisk undersøgelse.

Svaret vil foreligge efter ca. 7 - 10 dage.

Ved komplikationer:

Efter udtagning af vævsprøver kan der komme en lille smule blod i afføringen det første døgn.

I særdeles sjældne tilfælde kan der efter polypfjernelse opstå kraftig blødning eller hul på tarmen, som vil kræve indlæggelse på hospital. Skulle der opstå kraftig blødning, smerter eller feber, skal du straks kontakte, vagtlæge eller nærmeste hospital/akutklinik (skadestue).

Jeg har modtaget både skriftlig og mundtlig vejledning omkring undersøgelsen. Jeg har forstået vejledningen og accepterer undersøgelsen.

Dato: _____

Navn: _____

Cpr. nummer: _____